



(12) **Oversettelse av
europeisk patentskrift**

(11) **NO/EP 2193717 B1**

NORGE

(19) NO
(51) Int Cl.
A01N 43/56 (2006.01)

Patentstyret

(21)	Oversettelse publisert	2011.10.03
(80)	Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet:	2011.05.25
(86)	Europeisk søknadsnr:	10157582.7
(86)	Europeisk innleveringsdag	2008.04.23
(87)	Den europeiske søknadens Publiseringdato	2010.06.09
(30)	Prioritet	2007.04.25 EP 07008370
(84)	Utpekte stater	AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR
	Utpekte samarbeidende stater	AL BA MK RS
(62)	Avdelt fra	EP2150113, med inndato 2008.04.23
(73)	Innehaver	Syngenta Participations AG., Schwarzwaldallee 2154058 Basel, Sveits
(72)	Oppfinner	Tobler, Hans, Birsigstrasse 1294054, Basel, CH-Sveits Walter, Harald, Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhau4332, Stein, Sveits Haas, Ulrich Johannes, Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhau4332, Steine, Sveits
(74)	Fullmektig	Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge

(54) Benevnelse **Fungicide sammensetninger**

(56) Anførte publikasjoner WO-A-2004/035589 B1, WO-A1-2007/048556 B1, WO-A-2006/037632 B1

I

Foreliggende oppfinnelse vedrører nye fungicide sammensetninger egnede for kontroll av sykdommer forårsaket av fytopatogener, spesielt fytopatogene sopper, og en fremgangsmåte for å kontrollere sykdommer på nyttige planter, spesielt rustsoppsykdommer på soyabønneplanter.

5

Det er kjent fra WO 04/35589 og WO 06/37632 at visse tricykliske aminderivater og blandinger omfattende nevnte aminderivater har biologisk aktivitet mot fytopatogene sopper. På den andre siden er forskjellige fungicide forbindelser fra forskjellig kjemiske klasse velkjente som plantefungicider for anvendelse i


- 10 forskjellige avlinger av dyrkede planter. Imidlertid tilfredsstiller avlingstoleranse og aktivitet mot fytopatogene plantesopper ikke alltid behovene innen jordbruk i mange henseender og aspekter. For eksempel var det tidligere, i de viktigste områdene for dyrking av soyabønner ikke kjent noen økonomisk signifikante fytopatogener. I den senere tid har imidlertid en økning i av alvorlige
- 15 rustsoppinfeksjoner i soyabønner avlinger i Sør-Amerika ved den skadelige soppen Phakopsora pachyhizi resultert i betydelige utbyttetap. De fleste vanlige fungicider er uegnede for å kontrollere rustsopp i soyabønner eller deres virkning mot Phakopsora pachyhizi er utilfredsstillende.

20

På bakgrunn av de ovenfor nevnte behovene innen jordbruk for å øke avlingstoleransen og/eller å øke aktiviteten mot fytopatogene sopper foreslås det derfor, ifølge foreliggende oppfinnelse en ny sammensetning som er egnet for å kontrollere sykdommer forårsaket av fytopatogener omfattende

- 25 en sammensetning egnet for kontroll av sykdommer forårsaket av fytopatogener omfattende

(A) en forbindelse a v formel I



30

hvor R₁ er difluormetyl eller trifluormetyl og X er klor, fluor eller brom; og


(B) mandipropamid.

Det er funnet av anvendelsen av komponent (B) i kombinasjon med komponent (A) overraskende og vesentlig forbedrer effektiviteten av sistnevnte mot sopp, og vice versa. I tillegg er fremgangsmåten effektiv mot et videre spektrum av slike sopper som kan bekjempes med de aktive bestanddelene i henhold til denne metoden, når de anvendes alene.

- Et ytterligere trekk ved foreliggende oppfinnelse er en fremgangsmåte for å kontrollere sykdommer på nyttige planter eller formeringsmateriale for slike, som omfatter påføring på nyttige planter, voksestedet eller formeringsmateriale for disse av en sammensetning ifølge oppfinnelsen. Foretrukket er en fremgangsmåte som omfatter påføring på nytteplantene eller deres voksested av en sammensetning ifølge oppfinnelsen, mer foretrukket på nytteplantene. Foretrukket er videre en fremgangsmåte som omfatter påføring på formeringsmaterialet for nytteplantene av en sammensetning ifølge oppfinnelsen.

Forbindelser av formel I opptrer i to forskjellig steroisomerer, som beskrives som de enkle enantiomerene av formler I_I og I_{II}:

20



Oppfinnelsen dekker alle slike steroisomerer og blandinger derav i ethvert forhold. Ifølge oppfinnelsen betyr "racemisk forbindelse av formel (I)" en racemisk blanding av forbindelser I_I og I_{II}.

En fortrukket utførelsesform av oppfinnelsen er representert ved de forbindelsene som omfatter som komponent (A) en forbindelse av formel (I) hvor R₁ er difluormetyl. Ytterligere foretrukne forbindelser av formel (I) er:



- 3-difluormetyl-1-metyl-1H-pyrazol-4- karboksylsyre(9-diklormetylidens-
benzonorbornen-5-yl)amid (forbindelse A-1.1); 3-difluormetyl-1-metyl-1H-pyrazol-
4- karboksylsyre(9-difluormetylidens-benzonorbornen-5-yl)amid (forbindelse A-1.2);
og 3-difluormetyl-1-metyl-1H-pyrazol-4- karboksylsyre(9-dibrommetylidens-
benzonorbornen-5-yl)amid (forbindelse A-1.3).

Angivelsen av substituent X som klor, fluor eller brom betyr at begge substituenter
X har samme betydning.

- 10 En foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen er representert ved de forbindelsene
som omfatter som komponent A) en forbindelse av formel (I), hvor R₁ er
trifluormetyl. Ytterligere foretrukne forbindelser av formel (I) er:
1-metyl-3-trifluormetyl-1H-pyrazol-4- karboksylsyre(9-diklormetylidens-
benzonorbornen-5-yl)amid (forbindelse A-1.4);
15 1-metyl-3-trifluormetyl-1H-pyrazol-4- karboksylsyre(9-difluormetylidens-
benzonorbornen-5-yl)amid (forbindelse A-1.5); og
1-metyl-3-trifluormetyl-1H-pyrazol-4- karboksylsyre(9-dibrommetylidens-
benzonorbornen-5-yl)amid (forbindelse A-1.6).
- 20 Spesielt foretrukket (B) mandipropamid.
Ytterligere foretrukne sammensetninger ifølge oppfinnelsen omfatter som
komponent (A) forbindelsen 3-difluormetyl-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboksylsyre(9-
diklormetylidens-benzonorbornen-5-yl)amid (forbindelse A-1.1) og som komponent
(B) mandipropamid.
- 25 Forbindelsene av formel (I) kan fremstilles som beskrevet nedenfor med henvisning
til reaksjonsskjemaer 1 til 3.

4


Skjema 1



5

- Som vist i skjema 1, kan en forbindelse med formel (I), hvor R₁ og X er som definert ovenfor, syntetiseres ved å omsette en forbindelse med formel (II), hvor R₁ er som definert ovenfor og R' er C₁₋₅ alkyl, med et anilin av formel (III), hvor X er som definert overfor, i nærvær av NaN(TMS)₂ ved -10°C til omgivelsestemperatur, 10 fortrinnsvis i tørr THF, som beskrevet av J. Wang *et al. Synlett*, **2001**, 1485.

Skjema 2



15

- Alternativt, som vist i skjema 2, kan en forbindelse av formel (I), hvor Het er som definert i skjema 1, R₁ og X er som definert ovenfor, fremstilles ved å omsette en forbindelse av formel (II'), hvor Het er som definert ovenfor, med anilin av formel (III), hvor X er som definert ovenfor i nærvær av et aktiverende middel, så som 20 BOC-Cl (bis-(2-okso-3-oksazolidinyl)forfinsyre), og to ekvivalenter av base, så som trietylamin, i et oppløsningsmiddel, så som dikklorometan (som beskrevet for eksempel av J. Cabre *et al. Synthesis* **1984**, 413) eller ved å omsette en

- forbindelse av formel (II'), hvor Het er som definert ovenfor og Q er klor, fluor eller brom, med et anilin av formel (III), hvor X er som definert ovenfor, i nærvær av en ekvivalent av en base, så som trietylamin eller natrium – eller kaliumkarbonat eller -bikarbonat, i et oppløsningmiddel, så som díklormetan, etylacetat eller N,N-dimetylformamid, fortrinnsvis ved -10 til 30°C. Forbindelsen av formel (II'') oppnås fra en forbindelse av formel (II') ved behandling med et halogenerende middel, så som tonylklorid, tonylbromid, oksalkylklorid, fosgen, SF₄/HF, DAST ((diethylamino)svoveltrifluorid) i et oppløsningsmiddel, så som toluen, díklormetan eller acetonitril.


10

Forbindelsene (II) og (II') er generelt kjente forbindelser og kan fremstilles som beskrevet i den kjemiske litteraturen eller oppnås fra kommersielle kilder.

Forbindelsen (III) er en ny forbindelse og kan fremstilles som beskrevet under henvisning til skjema 3.

15

Skjema 3



Som vist i skjema 3 kan forbindelsen med formel (III) fremstilles ved en *Bechamp* reduksjon eller ved andre etablerte fremgangsmåter, for eksempel ved selektiv katalytisk hydrogenering av nitroforbindelsene (E), (F) og (G).


- 5 9-dihalogenmetyliden-5-nitro-benzonorbornene (E) hvor X er klor, brom eller fluor kan oppnås ved *Wittig* olefinering av ketonene (D) med *in situ* generert dihalogenmetyliden fosforaner $R''_3P=C(R^4)R^5$, hvor R'' er trifenyl, tri C₁₋₄alkyl eller tridimethylamin og X er halogen, i henhold til, eller analogt, fremgangsmåten beskrevet av H.D.Martin et al, *Chem. Ber.* 118, 2514 (1985), S. Hayashi et al, *Chem. Lett.* 1979, 983 eller M. Suda, *Tetrahedron Letters*, 22, 1421 (1981).

Forbindelser av formel (I) kan oppnås som beskrevet i eksempler H1 til H7.

EKSEMPEL 1

15

Dette eksempelet illustrerer fremstillingen av 1-metyl-3-trifluormetyl-1H-pyrazol-4-karboksylsyre(9-diklormetyliden-benzonorbornen-5-yl)amid (forbindelse A-1.4):




20

9-diklormetylen-5-amino-benzonorbornen (175 mg, 0.729mmol, fremstilt som beskrevet i eksempel 6) i diklormetan (10ml) ble omsatt med 1-metyl-3-trifluormetyl-1H-pyrazol-karboksylsyre (170mg, 0,874mmol, 1,2 ekv.) i nærvær av bis-(2-okso-3-oksazolidinyl)-fosfinsyreklorid (278mg, 1,09 mmol, 1,5 ekv.) og trietylamin (184mg, 1,821mmol, 2,5 ekv.) ved omgivelsestemperatur under omrøring i 23 timer. Reaksjonsblandingen ble ekstrahert med mettet natriumbikarbonatoppløsning og mettet saltvannsoppløsning, tørket over Na₂SO₄ og renset på silikagel i etylacetat-heksan (1:1). Det ble oppnådd 210 mg (69% av

teoretisk) av 1-metyl-3-trifluormetyl-1H-pyrazol-4-karboksylsyre(9-diklormetyliden-benzonorbornen-5-yl)amid (forbindelse A-1.4, smp. 179-181°C).

EKSEMPEL 2

- 5 Dette eksemplet illustrerer fremstillingen av 9-(3-pentyliden)-5-nitrobenzonorbornadien:




10

- Til en godt omrørt oppløsning av isopentylnitritt (2,31 ml, 1,3 ekv.) i dimetoksyetan (50 ml) ved 58°C ble en blanding av 6-nitroantranilsyre (2,76 g, 1 ekv.) og 6,6-dietylfulven (6,45 g av 79% renhet, 2,5 ekv.) oppløst i 25 ml dimetoksyetan tilsatt dråpevis i løpet av 8 minutter mens temperaturen steg til 67°C. Etter 30 minutter ble den mørke reaksjonsblandingen inndampet og renset på silikagel i heksan-ethylacetat-(20:1) for å gi 3,02 g (78%) av det ønskede produktet som en olje som styrknet ved romtemperatur (smp. 60 - 61°C).

20

EKSEMPEL 3

Dette eksemplet illustrerer fremstillingen av 9-(3-pentyliden)-5-nitrobenzonorbornen:




25

- 9-(3-pentyliden)-5-nitro-benzonorbornadien (7,97 g fremstilt som beskrevet i Eksempel 2) i THF (70 ml) ble hydrogenert ved 20°C i nærvær av Rh(PPh₃)₃Cl (Wilkinson's katalysator: 0,8 g). Reaksjonen opphørte etter opptak av en ekvivalent hydrogen. Inndampning og filtrering av råproduktet på silikagel i etylacetat-heksan-(100:2) ga det ønskede produktet som en olje (7,90 g) som styrknet ved henstand ved romtemperatur (smp. 69 - 56°C).

EKSEMPEL 4

Dette eksemplet illustrerer fremstillingen av 9-okso-5-nitro-benzonorbornen

5




9-(3-pentyliden)-5-nitro-benzonorbornen (7,0 g, 27,2 mmol fremstilt som beskrevet i Eksempel 3) oppløst i díklormetan (300 ml) og metanol (5 ml) ble ozonbehandlet (2,8 l O₂/min., 100 Watt, tilsvarende 9,7 g O₃/h) ved -70°C inntil en 10 vedvarende blåfarge ble observert (etter ca. 15 minutter). Reaksjonsblandingen ble spylt med nitrogengass. Trifenylfosfin (8,4 g, 32,03 mmol, 1,18 ekv.) ble tilsatt og temperaturen ble tillatt å oppvarmes til 20 – 25°C. Etter avdampning av oppløsningsmidlet ble resten renset på silitkagel i heksan-EtOAc 3:1 for å gi 5,2 g av forbindelse 36.01 (smp. 112 - 114°C).

15

EKSEMPEL 5

Dette eksemplet illustrerer fremstillingen av 9-difluormetyliden-5-nitro-benzonorbornen

20




Til en oppløsning av dibromdifluormetan (6,30 g, 30 mmol) ved 0°C i THF (50 ml) ble det tilsatt tris-(dimetylamino)-fosfan (10.1 g ved 97%, ekvivalent med 11,2 ml, 60 mmol) i THF (30 ml) i løpet av 20 minutter. Til den resulterende suspensjonen ble det, etter omrøring i 1 time ved romtemperatur, dråpevis tilsatt en oppløsning av 9-okso-5-nitro-benzonorbornen (6,10 g, 30 mmol; fremstilt som beskrevet i Eksempel 4) i THF (20 ml) i løpet av 25 minutter, etterfulgt av omrøring i 21 timer. Suspensjonen ble hellt på is-vann og ekstrahert med etylacetat. Rensing på silitkagel i etylacetat-heksan (1:4) ga 4,675 g 9-difluormetyliden-5-nitro-benzonorbornen (smp. 99 - 101°C).

EKSEMPEL 6

Dette eksemplet illustrerer fremstillingen av 9-diklormetyliden-5-nitrobenzonorbornen

5




Tørr karbontetraklorid (5,9 g, 33 mmol) ble omsatt med trifenyfosfin (14,46, 55.1 mmol) i diklormetan (30 ml) ved romtemperatur i 1 time. 9-okso-5-nitrobenzonorbornen (5,60 g, 27,56 mmol; fremstilt som beskrevet i Eksempel 4) i 10 diklormetan (10 ml) ble tilsett dråpevis og omrørt i 20 timer ved romtemperatur. Etter veldig opparbeidelse (is-vann) og ekstraksjon med diklormetan ble råproduktet renset på silikagel i etylacetat-heksan-(1:4) for å oppnå det ønskede 9-diklormetyliden-5-nitro-benzonorbornen (1,83 g; smp. 136 - 137°C). Noe utgangsmateriale (4,06 g) ble gjenvunnet.

15

EKSEMPEL 7

Dette eksemplet illustrerer fremstillingen av 9-dibrommetyliden-5-nitrobenzonorbornen

20



Karbontetrabromid (4,66 g ved 98%, 13,8 mmol) ble omsatt under omrøring med trifenyfosfin (7,23 g, 27,6 mmol) i diklormetan (50 ml) i 50 minutter ved romtemperatur. 9-okso-5-nitro-benzonorbornen (2,8 g, 13,8 mmol; fremstilt som beskrevet i Eksempel 4) i diklormetan (10 ml) ble tilsett dråpevis og omrørt over 25 natten ved romtemperatur. Vandig opparbeidelse (is-vann) og ekstraksjon med diklormetan etterfulgt av kolonnekromatografi (etylacetat-heksan-(1:9) av råproduktet ga det ønskede produktet 9-dibrommetyliden-5-nitro-benzonorbornen (2,1 g, smp. 153-155°C).

30

Tabell 1

Tabell 1 viser smeltepunkt og NMR-data, alle med CDCl_3 som opplosningsmiddel, med mindre annet er angitt, for forbindelser av formel (I). I tabellen er
5 temperaturer gitt i grader Celsius, "NMR" betyr kjernemagnetisk resonansspektrum og følgende forkortelser anvendes:

Smp = smeltepunkt

b.p. = kokepunkt

s = singlett

br = bred

10 d = dublett

dd = dobbeldubletter

t = tripplett

k = kvartett

m = multiplett

ppm = deler pr. million

THF = tetrahydrofuran

Forbindelse	Smp. (°C)	¹ H-NMR protonskift δ (ppm) (CDCl ₃)
A-1.1	179 – 181	8,06 (s, 1H), 7,69 (d overlappet ved brd signal, utbyttbart med D ₂ O), 7,18 (s, 1H), 7,06 (d, 1H), 4,00 (s, 3H), 3,96 (m, 2H), 2,12 (m, 2H), 1,51 (m, 1H), 1,39 (m, 1H)
A-1.2	137 – 143	8,06 (s, 1H), 7,68 (brd, utbyttbart med D ₂ O, 1H), 7,67 (d, 1H), 7,14 (d, 1H), 4,00 (s, 3H), 3,94 (m, 2H), 2,06 (m, 2H), 1,48 (m, 1H), 1,36 (m, 1H)
A-1.3	198 – 200	8,06 (s, 1H), 7,71 (d, 1H), 7,68 (brd, utbyttbart med D ₂ O, 1H), 7,18 (t, 1H), 7,05 (d, 1H), 4,00 (s, 3H), 3,95 (m, 1H), 3,93 (m, 1H), 2,12 (m, 2H), 1,50 (m, 1H), 1,38 (m, 1H)
A-1.4	183 – 188	7,78 (d, 1H), 7,70 (brd, utbyttbart med D ₂ O, 1H), 7,39 (brd s, 1H), 7,16 (t, 1H), 7,01 (d overlappet fra brd s, 2H), 4,00 (m, 1H), 3,94 (m, 1H), 3,72 (s, 3H), 2,10 (m, 2H), 1,51 (m, 1H), 1,38 (m, 1H)
A-1.5	133 – 135	7,76 (d, 1H), 7,70 (brd, utbyttbart med D ₂ O, 1H), 7,39 (brd s, 1H), 7,13 (t, 1H), 7,01 (brd s 1H), 7,00 (d, 1H), 3,98 (m, 1H), 3,93 (m, 1H), 3,72 (s, 3H), 2,04 (m, 2H), 1,49 (m, 1H), 1,36 (m, 1H)
A-1.6	155 – 158	7,79 (d, 1H), 7,70 (brd, utbyttbart med D ₂ O, 1H), 7,39 (brd s, 1H), 7,17 (t, 1H), 7,02 (d, 1H), 7,01 (brd s, 1H), 3,98 (m, 1H), 3,91 (m, 1H), 3,72 (s, 3H), 2,11 (m, 2H), 1,50 (m, 1H), 1,39 (m, 1H).

Komponenten (B) er kjent og beskrevet i WO 01/87822.

- 5 Gjennom foreliggende dokument står uttrykket "sammensetning" for de forskjellige blandingene eller kombinasjonene av komponenter (A) og (B) for eksempel i en enkelt "klar-til-blanding" form, i en kombinert sprayblanding bestående av separate formuleringer av den enkelte aktive bestanddels komponent, så som en

"tankblanding", eller en kombinert anvendelse av de enkelte aktive bestanddelene når de anvendes på en trinnvis måte, dvs. ett etter det andre med en relativt kort tidsperiode, så som få timer eller dager. Rekkefølgen for påføring av komponentene (A) og (B) er ikke vesentlig for utførelsen av foreiggende oppfinnelse.

Sammensetningen ifølge oppfinnelsen er effektiv mot skadelige mikroorganismer, så som mikroorganismer som forårsaker fytopatogene sykdommer, spesielt mot fytopatogene sopp og bakterier.

10

Sammensetningene ifølge oppfinnelsen er effektive spesielt mot fysiopatogene sopp tilhørende følgende klasser: Ascomycetes (for eksempel Venturia, Podosphaera, Erysiphe, Monilinia, Mycosphaerella, Uncinula); Basidiomycetes (for eksempel the genus Hemileia, Rhizoctonia, Phakopsora, Puccinia, Ustilago, Tilletia); Fungi imperfecti (også kjent som Deuteromycetes, for eksempel Botrytis, Helmintosporium, Rhynchosporium, Fusarium, Septoria, Cerospora, Alternaria, Pyricularia og Pseudocercosporelia); Oomycetes (for eksempel Phytophthora, Peronospora, Pseudoperonospora, Albugo, Bremia, Pythium, Pseudosclerospora, Plasmopara).

20

I henhold til oppfinnelsen omfatter "nytteplanter" typisk følgende species av planter:
 vindruer; cerealer, så som hvete, bygg, rug og havre; roer, så som sukkerroer eller fôrroer; frukter, så som kjernefrukter, stenfrukter eller myke frukter, f.eks. epler, pærer, plommer, ferskener, mandler, kirsebær, jordbær, bringebær eller bjørnebær; belgplanter, så som bønner, linser, erter eller soyabønner; oljeplanter, så som rasp, valmue, oliven, solsikke, kokosnøtt, ricinusoljeplanter, kakaobønner eller jordnøtter; agurkplanter, så som gresskar, agurker eller meloner; fiberplanter, så som bomull, lin, hamp eller jute; sitrusfrukt, så som appelsiner, sitroner, grapefrukt eller mandariner; grønnsaker, så som spinat, bladsalat, asparges, kål, gulrøtter, løk, tomater, poteter, agurkrot eller paprika; laurbærfamilien, så som avokado, kanel eller kamfer; mais; tobakk; nøtter; kaffe; sukkerroer; te; viner; humle; durian; bananer; naturgummiplanter; torv eller ornamentale planter, så som blomster, busker, bredbladede trær eller eviggrønne trær, for eksempel nåletrær. Denne listen utgjør ingen begrensning.

- Betegnelsen "nytteplanter" skal forstås som omfattende også nyttige planter som er gjort tolerante overfor herbicider som bromoksynil eller klasser av herbicider (så som for eksempel HPPD-inhibitorer, ALS-inhibitorer, for eksempel primisulfuron, prosulferon og trifloksysulfuron, EPSPS (5-enol-pyrovol-shikimate-3-fosfat-syntase) inhibitorer, GS (glutamin syntetase) inhibitorer av PPO (protoporfyrinogen-oksidase)inhibitorer) som et resultat av konvensjonelle dyrkningsfremgangsmåter eller en teknologi. Et eksempel på en avling som er gjort tolerant overfor imidazolinoner, for eksempel imazamoks, ved konvensjonelle dyrkningsmetoder (mutagenese) er Clearfield® sommerraps (Canola). Eksempler på avlinger som er gjort tolerante overfor herbicider eller klasser av herbicider ved genteknologiske fremgangsmåter, omfatter glyfosat- og glufosinatresistente maisvarianter som er vanlig tilgjengelig under varemerkene RoundupReady®, Herculex I® og LibertyLink®.
- 15 Betegnelsen "nytteplanter" skal forstås som innbefattende også nytteplanter som er transformert ved anvendelse av rekombinant DNA-teknikk på en slik måte at de er i stand til å syntetisere ett eller flere selektivt virkende toksiner, som er kjent for eksempel fra toksinproduserende bakterier, spesielt de av slekten Bacillus.
- 20 Betegnelsen "nytteplanter" skal forstås som innbefattende også nytteplanter som er transformert ved anvendelse av rekombinante DNA-teknikker på en slik måte at de er i stand til å syntetisere antipatogene stoffer som har en selektiv virkning, så som for eksempel de såkalte "patogeneserelaterte proteinene" (PRP'er, se for eksempel EP-A-0 392 225). Eksempler på slike antipatogene stoffer og transgene planter
- 25 som er i stand til å syntetisere slike antipatogene stoffer, er kjente for eksempel fra EP-A-0 392 225, WO95/33818 og EP-A-0 353 191. Fremgangsmåtene for fremstilling av slike transgene planter er generelt kjente for fagpersonen og er for eksempel beskrevet i publikasjonene nevnt ovenfor.
- 30 Betegnelsen "lokasjon" for en nytteplante som er anvendt heri, er ment å omfatte steder hvor nytteplantene gror, hvor planteformeringsmateriale sås og hvor planteformeringsmaterialene av nytteplantene vil bli plassert i jorden. Et eksempel på en slik lokasjon er et felt hvor avlingsplanter gror.
- 35 Betegnelsen "planteformeringsmateriale" er underforstått å angi generative deler av planten, så som frø, som siden kan anvendes for formering, og vegetativt materiale, så som avkutt eller knoller, for eksempel poteter. Det kan nevnes for

eksempel frø (i streng forstand), røtter, frukter, rotknoller, jordstengler og deler av planter. Spirende planter og unge planter som skal forflyttes etter spiring eller etter gjennombrudd fra jorden, kan også nevnes. Disse unge plantene kan beskyttes før forflytning ved en total eller delvis behandling ved neddykking.

- 5 Fortrinnsvis skal "planteformeringsmaterialet" forstås å betegne frø.

Sammensetningene ifølge oppfinnelsen kan også anvendes innen feltet beskyttelse av lagringsvarer mot angrep av sopp. I henhold til foreliggende oppfinnelse skal betegnelsen "lagringsvarer" forstås å betegne naturstoffer av vegetabilsk og/eller

- 10 animalsk opphav og deres bearbeidede former, som er tatt fra den naturlige livssyklusen og for hvilke langvarig beskyttelse er ønsket. Lagringsvarer av vegetabilsk opphav, så som planter eller deler derav, for eksempel stilk, blader, rotknoller, frø, frukter eller korn, kan beskyttes i nyhøstet tilstand eller i bearbeidet form, så som fortørket, fuktet, findelt, malt, presset eller brent. Noe som også
- 15 faller under definisjonen av lagringsvarer er tømmer, enten i form av rått tømmer, så som konstruksjonstømmer, elektrisitetsmaster eller barriérer, eller i form av ferdige gjenstander, så som møbler eller gjenstander fremstilt av tre.

Lagringsvarer av animalsk opphav er hud, lær, pelser, hår og lignende.

- 20 Sammensetningene ifølge foreliggende oppfinnelse kan forebygge uheldige effekter som nedbrytning, misfarging eller mugg. Fortrinnsvis forstås "lagringsvarer" å betegne naturstoffer av vegetabilsk opphav og/eller deres bearbeidede former, mer foretrukket frukter og deres bearbeidede former, så som eplefrukter, stenfrukter, myke frukter og sitrusfrukter og deres bearbeidede former. I en annen foretrukket utførelsesform av oppfinnelsen forstås "lagringsvarer" å betegne tre.

- 25 Et ytterligere trekk ved foreliggende oppfinnelse er derfor en fremgangsmåte for beskyttelse av lagringsvarer, som omfatter påføring på lagringsvarene av en sammensetning ifølge oppfinnelsen.

- 30 Sammensetningene ifølge foreliggende oppfinnelse kan også anvendes innen feltet beskyttelse av et teknisk materiale mot angrep av sopp. I henhold til foreliggende oppfinnelse omfatter betegnelsen "teknisk materiale" papir, tepper; konstruksjonsmaterialer; kjøle- og oppvarmingssystemer; veggplater; ventilasjon og luftkondisjoneringssystemer og lignende; fortrinnsvis forstås "teknisk materiale"
- 35 å betegne veggplater. Sammensetningene ifølge foreliggende oppfinnelse kan forebygge uheldige effekter så som nedbrytning, misfarging eller mugg.

- Sammensetningene ifølge oppfinnelsen er spesielt effektive mot mjøldugg; rustsopper; bladflekksyke-species; tidlige plantesykdommer og muggtyper; spesielt mot Septoria, Puccinia, Erysiphe, Pyrenophora og Tapesia i cerealer; Phakopsora i soyabønner; Hemileia i kaffe; Phragmidium i roser; Alternaria i poteter, tomater og 5 agurkplanter; Sclerotinia i torv, grønnsaker, solsikke og oljefrø raps; svartråte, rødbrann, mjøldugg, gråsopp og "dead arm"-sykdom i vinranke; Botrytis cinerea i frukter; Monilinia spp i frukter og Penicillium spp i frukter.
- Sammensetningene ifølge oppfinnelsen er videre spesielt effektive mot frøbårne og 10 jordbårne sykdommer, så som Alternaria spp., Ascochyta spp., Botrytis cinerea, Cercospora spp., Claviceps purpurea, Cochliobolus sativus, Colletotrichum spp., Epicoccum spp., Fusarium solani, Fusarium subglutinans, Gäumannomyces graminis, Helminthosporium spp., Microdochium nivale, Phoma spp., Prenophora graminea, Pyricularia oryzae, Rhizoctonia solani, Phizoctonia cerealis, Sclerotinia spp., Septoria spp., Sphaelotheca reilliana, Tilletia spp., Typhula incarnata, Urocystis occulta, Ustilago spp. Eller Verticillium spp.; spesielt mot patogener av cerealer, så som hvete, bygg, rug eller havre; mais; ris; bomull; soyabønne; torv; sukkerroer; oljefrøraps; poteter; belgfruktavlinger, så som erter, linser eller kikerter; og solsikke.
- 20 Sammensetningene ifølge oppfinnelsen er videre spesielt effektive mot etterinnhøstingssykdommer, så som Botrytis cinerea, Colletotrichum musae, Curvularia lunata, Fusarium semitecum, Geotrichum candidum, Monilinia fructicola, Monilinia fructigena, Monilinia laxa, Mucor piriformis, Penicillium italicum, 25 Penicillium solitum, Penicillium digitatum eller Penicillium expansum spesielt mot patogener av frukter, så som eplefrukter, for eksempel epler og pærer, stenfrukter, for eksempel ferskener og plommer, citrus, meloner, papaya, kiwi, mango, bær, for eksempel jordbær, avokado, granatepler og bananer og nøtter.
- 30 Sammensetningene ifølge oppfinnelsen er spesielt nyttige for å kontrollere følgende sykdommer på følgende avlinger:
- Alternaria species i frukt og grønnsaker; Ascochyta species i belgfrukter; Botrytis cinerea i jordbær, tomater, solsikke, belgfruktavlinger, grønnsaker og druer, så som Botrytis cinera på druer; Cercospora arachidicola i peanøtter; Cochliobolus sativus i cerealer; Colletotrichum species i belgfruktavlinger; Erysiphe species i cerealer; så som Erysiphe graminis på hvete og Erysiphe graminis på bygg; Erysiphe cichoracearum og sphaerotheca fuliginea i agurkplanter; Fusarium species

- i cerealer og mais; *Gäumannomyces graminis* i cerealer og plener; *Helminthosporium* species i mais, ris og poteter; *Hemileia vastatrix* på kaffe; *Mildrodochium* species i hvete og ryg; *Mycosphaerella fijiensis* i bananer; *Phakopsora* species i soyabønner, så som *Phakopsora pachyrizi* i soyabønner;
- 5 *Puccinia* species i cerealer, bredbladede avlinger og flerårige planter; så som *Puccinia recondita* på hvete, *Puccinia striiformis* på hvete og *Puccinia recondita* på rug; *Pseudocercosporella* species i cerealer, så som *Pseudocercosporella herpotrichoides* i hvete; *Phragmidium mucronatum* i roser; *Podosphaera* species i frukter; *Pyrenophora* species i bygg; så som *Pyrenophora teres* på bygg, *Pyricularia oryzae* i ris; *Ramularia collo-cygni* i bygg; *Rhizoctonia* species i bomull, soyabønne, cerealer, mais, poteter, ris og plener, så som *Rhizoctonia solani* på poteter, ris, torv og bomull; *Rhynchosporium secalis* på bygg; *Rhynchosporium secalis* på rug; *Sclerotinia* species i plener, bladsalat, grønnsaker og oljefrøraps, så som *Sclerotinia sclerotiorum* på oljefrøraps og *Sclerotinia homeocarpa* på torv; *Septoria* species i cerealer, soyabønner og grønnsaker, så som *Septoria tritici* på hvete, *Septoria nodorum* på hvete og *Septoria glyciner* på soyabønner; *Sphacelotheca reilliana* i mais; *Tilletia* species i cerealer; *Uncinula necator*, *Guignardia bidwellii* og *Phomopsis viticola* i vinranker; *Urocystis occulta* i rug; *Uromyces* species i bønner; *Ustilago* species i cerealer og mais; *Venturia* species i frukter, så som *Venturia inequalis* på eple; *Monilinia* species på frukter; *Penicillium* species på citrus og epler.

Generelt er vektforholdet mellom komponent (A) og komponent (B) fra 2000 : 1 til 1:1000. Et ikke-begrensende eksempel på slike vektforhold er forbindelse av formel I: forbundelse av formel B-2 er 10:1. Vektforholdet mellom komponent (A) til komponent (B) er fortrinnsvis fra 100:1 til 1:100, mer foretrukket fra 20:1 til 1:50.

Det er overraskende funnet at visse vektforhold mellom komponent (A) og komponent (B) er i stand til å gi opphav til synergistisk aktivitet. Et ytterligere trekk ved oppfinnelsen er følgelig sammensetninger hvor komponent (A) og komponent (B) er tilstede i sammensetningen i menger som gir en synergistisk effekt. Denne synergistiske aktiviteten fremgår fra det faktum at den fungicidiske aktiviteten av sammensetningen omfattende komponent (A) og komponent (B) er større enn summen av de fungicidiske aktivitetene for komponent (A) og komponent (B) på to måter. For det første er påføringsratene for komponent (A) og komponent (B) nedsatt mens virkningen forblir like god, hvilket betyr at blandingen av aktiv bestanddel fremdeles oppnår en høy grad av fytopatogen

kontroll selv når de to individuelle komponentene er blitt totalt ineffektive i et slikt lavt område for påføringsrate. For det andre er det en vesentlig utvidelse av spekteret av fytopatogener som kan kontrolleres.

- 5 En synergistisk effekt foreligger når virkningen av en aktiv bestanddelskombinasjon er større enn summen av virkningene av de individuelle komponentene. Virkningen som kan forventes E for en gitt aktiv bestanddelskombinasjon adlyder den såkalte COLBY-formelen og kan beregnes som følger (COLBY, S.R. "Calculating synergistic and antagonistic responses of herbicide combination". Weeds, Vol. 15, sidene 20 – 10 22, 1967):

ppm = milligram aktiv bestanddel (=a.i.) pr. liter sprayblanding

X = % virkning ved aktiv bestanddel A) ved anvendelse av p ppm aktiv bestanddel

Y = % virkning av aktiv bestanddel B) ved anvendelse av q ppm aktiv bestanddel.

- 15 I henhold til COLBY, er den ventede (additive) virkningen av aktive bestanddeler A)+B) ved anvendelse av p+q ppm aktiv bestanddel

$$E = X + Y - \frac{X \cdot Y}{100}$$

- 20 Dersom virkningen som reelt observeres (O) er større enn den forventede virkningen (E), er virkningen av kombinasjonen superadditiv, dvs. det foreligger en synergistisk effekt. Uttrykt matematisk tilsvarer synergisme en positiv verdi for differansen av (O-E). I tilfellet med en rent komplementær addisjon av aktiviteter (ventet aktivitet) er nevnte forskjell (0-1) lik null. En negativ verdi av nevnte forskjell (O-E) angir et tap av aktivitet sammenlignet med den forventede aktiviteten.

- 25 Imidlertid kan, ved siden av den reelle synergistiske virkningen med hensyn til fungicidisk aktivitet, sammensetningene ifølge oppfinnelsen også ha ytterligere overraskende fordelaktige egenskaper. Eksempler på slike fordelaktige egenskaper som kan nevnes er: mer fordelaktig nedbrytbarhet; forbedret toksikologisk og/eller økotoksikologisk oppførsel; eller forbedrede egenskaper for nyteplantene innbefattende: tilsynekomst, avlingsutbytte, mer utviklet rotsystem; rotkulturforbedring, økning i plantehøyde, større blader, mindre døde basalblader, sterkere rotsystem, grønnere bladfarge, mindre gjødningsmidler påkrevet, mindre frø er påkrevet, mer produktivt rotsystem, tidligere blomstring, tidligere

kornmodning, mindre planteledging, forøket skuddvekst, forbedret plantekraft og tidlig spiring.

- Noen sammensetninger ifølge oppfinnelsen har en systemisk virkning og kan
- s anvendes som bladverk, jord- og frøbehandlingsfungicider.

Med sammensetningene ifølge oppfinnelsen er det mulig å inhibere eller ødelegge de fytopatogene mikroorganismene som opptrer i planter eller i deler av planter (frukt, blomster, blad, stammer, rotknoller, røtter) i forskjellige nytteplanter, mens

10 samtidig delen av planten som gror senere også beskyttes mot angrep ved fytopatogene mikroorganismer.

Sammensetningene ifølge oppfinnelsen kan påføres på de fytopatogene mikroorganismene, nytteplantene, voksestedet for disse, formeringsmaterialet for

15 disse, lagringsvarer eller tekniske materialer som er utsatt for mikroorganismeangrep.

Sammensetningene ifølge oppfinnelsen kan påføres før eller etter infeksjon av nytteplantene, forplantningsmaterialene derfor, lagringsvarer eller tekniske

20 materialer forårsaket av mikroorganismene.

Mengden av sammensetningen ifølge oppfinnelsen som skal påføres vil avhenge av forskjellige faktorer, så som de anvendte forbindelsene; gjenstanden for behandlingen, så som for eksempel planter, jord eller frø; typen behandling, så

25 som for eksempel spraying, støving eller frøbelegging; formålet med behandlingen, så som for eksempel profylaktisk eller terapeutisk; type sopp som skal kontrolleres og påføringstidspunktet.

Når det påføres på nytteplantene, blir komponent (A) typisk påført ved en rate på 5

30 til 2000 g a.i./ha, spesielt 10 til 1000 g a.i./ha, for eksempel 50, 75, 100 eller 200 g a.i./ha, typisk i forbindelse med 1 til 5000 g a.i./ha, spesielt 2 til 2000 g a.i./ha, for eksempel 100, 250, 500, 800, 1000, 1500 g a.i./ha av komponent (B).

I jordbrukspraksis avhenger påføringsratene av sammensetningene ifølge

35 oppfinnelsen av typen effekt som ønskes, og varierer typisk fra 20 til 4000 g total sammensetning pr. hektar.

Når sammensetningen ifølge oppfinnelsen anvendes for behandling av frø, er rater på 0,001 til 50 g av en forbindelse av komponent (A) pr. kilo frø, fortrinnsvis fra 0,01 til 10 g pr. kilo frø, og 0,001 til 50 g av en forbindelse av komponent (B) pr. kilo frø, fortrinnsvis fra 0,01 til 10 g pr. kilo frø, generelt tilstrekkelig.

5

- Sammensetningen ifølge oppfinnelsen kan anvendes i en hvilken som helst konvensjonell form, for eksempel i form av en dobbelpakke, et pulver for tørr frøbehandling (DS), en emulsjon for frøbehandling (ES), et flytbart konsentrat for frøbehandling (FS), en oppløsning for frøbehandling (LS), et veldig dispergerbart pulver for frøbehandling (WS), en kapselsuspensjon for frøbehandling (CF), en gel for frøbehandling (GF), et emuljonskonsentrat (EC), et suspensjonskonsentrat (SC), en suspo-emulsjon (SE), en kapselsuspensjon (CS), et vanndispergerbart korn (WG), et emulgerbart korn (EG), en emulsjon, vann-i-olje (EO), en emulsjon, olje-i-vann (EW), en mikroemulsjon (ME), en oljedispersjon (OD), et oljeblantbart flytbart (OF), et oljeblantbart flytende (OL), et oppløselig konsentrat (SL), en ultralav volumsuspensjon (SU), en ultralav volumvæske (UL), et teknisk konsentrat (TK), et dispergerbart konsentrat (DC), et fuktbart pulver (WP) eller en hvilken som helst teknisk tenkelig formulering i kombinasjon med adjuvanser som er akseptable innen jordbruk.

20

- Slike sammensetninger kan fremstilles på konvensjonell måte, for eksempel ved å blande de aktive bestanddelene med minst en egnet inert formuleringsadjuvans (for eksempel fortynningsmidler, oppløsningsmidler, fyllstoffer og eventuelt andre formuleringsbestanddeler så som surfaktanter, biocider, anti-frysetilsetninger, klebriggjørende midler, fortykningsmidler og forbindelser som tilveiebringer adjuvanseffekter). Også konvensjonelle formuleringer med langsom frigivelse kan anvendes der hvor langvarig virkningseffekt er ønsket. Spesielt kan formuleringer som skal påføres i sprayformer, så som veldig dispergerbare konsentrater (for eksempel EC, SC, DC, OD, SE, EW, EO og lignende), fuktbare pulvere og granuler, inneholde surfaktanter så som fuktende og dispergerende midler og andre forbindelser som tilveiebringer adjuvanseffekter, for eksempel kondensasjonsproduktet av formaldehyd med naftalensulfonat, et alkylarylsulfonat, et ligninsulfonat, et fettalkylsulfat og etoksylert alkylfenol og et oksylert fettalkohol.
- 35 Sammensetningene ifølge oppfinnelsen kan også omfatte ytterligere pesticider, så som for eksempel fungicider, insekticider eller herbicider.

En frøbeisingsformulering påføres på kjent måte på frøene ved anvendelse av sammensetningene ifølge oppfinnelsen og et fortynningsmiddel i egnet

frøbeisingsformuleringsform, for eksempel som en vandig suspensjon eller i en tørr pulverform som har godt vedheng til frøene. Slike frøbeisingsformuleringer er

- 5 kjente innen teknikken. Frøbeisingsformuleringer kan inneholde enkle aktive bestanddeler eller kombinasjonene av aktive bestanddeler i innkapslet form, for eksempel som kapsler eller mikrokapsler med langsom frigivelse.

Generelt omfatter formuleringene fra 0,01 til 90 vekt-% aktivt middel, fra 0 til 20%

- 10 jordbruksakseptabel surfaktant og 10 til 99,99% av faste eller flytende formuleringsinerte bestanddeler og adjuvanser, idet den aktive bestanddelen består av minst en forbindelse av komponent (A) sammen med en forbindelse av komponent (B), og eventuelt andre aktive midler, spesielt mikrobiocider og konserveringsmidler eller lignende. Konsentrerte former av sammensetninger
- 15 inneholder generelt mellom omtrent 2 og 80%, fortrinnsvis mellom omtrent 5 og 70 vekt-% aktivt middel. Påføringsformer av formulering kan for eksempel inneholde fra 0,01 til 20 vekt-%, fortrinnsvis fra 0,01 til 5 vekt-% aktivt middel. Mens kommersielle produkter fortrinnsvis vil bli formulert som konsentrater, vil sluttbruker normalt anvende fortynnede formuleringer.

20

Fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen tillater også god kontroll av andre farlige sopp som ofte opptrer i soyabønneplanter. De mest viktige soppsykdommene i soyabønner er Phakopsora pachyrhizi, Microsphaera diffusa, Cercospora kikuchi, Cercospora sojina, Septoria glycines og Colletotrichum truncatum, hvorav visse

- 25 omfatter det såkalte "sensesong sykdomskomplekset" og videre Rhizoctonia solani, Corynespora cassilicola, Sclerotinia sclerotiorum og Sclerosium rolfsii.

Som beskrevet ovenfor for betegnelsen "nytteplante" omfatter betegnelsen

"soyabønneplante" alle soyabønneplanter og alle varianter, innbefattende transgene

- 30 planter. Betegnelsen "soyabønneplante" omfatter spesielt glyfosat tolererbare soyabønneplanter.

Med "glyfosat tolererbare" menes at plantene for anvendelse i fremgangsmåten er resistente overfor glyfosatpåføring eller tolerante overfor glyfosat.

- 35 Glyfosattolerante planter er gjort tolerante overfor glyfosat ved konvensjonell foredling eller har vært utsatt for en transgen hendelse som tilveiebringer glyfosat resistens. Noen eksempler på slike foretrukne transgene planter som har

transgene hendelser som gir glyfosat resistens er beskrevet i US patent nr. 5.914.451; 5.866.775; 5.804.425; 5.776.760; 5.633.435; 5.627.061; 5.463.175; 5.312.910; 5.310.667; 5.188.642; 5.145.783; 4.971.908 og 4.940.835.

Anvendelsen av "ophopede" transgene hendelser i plantene er også overveid.

- 5 Opphopede transgene hendelser innbefatter ytterligere herbicid-resistente trekk, så som resistens overfor HPPD-inhibitorer, sulfonylureaer, glufosinat og bromoksynil er meget anvendt og er beskrevet i lett tilgjengelige ressurser. De opphopede transgene hendelsene kan også være rettet mot andre pesticid-resistente trekk, så som insekticid, nematicid, fungicid, også videre resistens, som kan oppnås ved
- 10 konvensjonell dyrking eller ved å innføre en transgen hendelse.

Linjer av transgene glyfosattolererbare avlingsplanter som er overveiende for anvendelse av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen, omfatter for eksempel Roundup Ready®Soybean 40-3-2.

- 15 En "transgen plante" refererer til en plante som inneholder genetisk materiale som ikke finnes (dvs. "eksogen") i en villtype-plante av samme species, sort eller kultivar. Det genetiske materialet kan omfatte et transgen, en innskuddsmutagenese-hendelse (så som ved transposon eller T-DNA-
- 20 innskuddsmutagenese), en aktiveringsmerkesekvens, en mutert sekvens, en homolog rekombinant hendelse eller en sekvens modifisert ved chimeroplasti. Typisk er det fremmede genetiske materialet innført i planten ved menneskelig manipulering, men en hvilken som helst fremgangsmåte kan anvendes som fagmannen vil kjenne til. En transgen plante kan inneholde en ekspresjonsvektor
- 25 eller kassett. Ekspresjonskassetten omfatter typisk en polypeptidkodende sekvens som er operabelt forbundet (dvs. er under regulatorisk kontroll av) egnede induserbare eller konstitutive regulatoriske sekvenser som tillater ekspresjonen av polypeptidet. Ekspresjonskassetten kan innføres i en plante ved transformasjon eller ved foredling etter transformasjon av en morplante. Som beskrevet tidligere,
- 30 refererer en plante til en hel plante, innbefattende kimplanter og modne planter, så vel som en plantedel, så som frø, frukt, blad eller rot, plantevev, plantecelle eller et hvilket som helst annet plantemateriale, for eksempel et planteeksplantat, så vel som avkommet derav, og in vitro systemer som etterligner de kjemiske eller cellulære komponenter eller prosesser i en celle.

Eksemplene som følger tjener til å illustrere oppfinnelsen, "aktive bestanddeler" betegner en blanding av komponent (A) og komponent (B) i et spesifikt blandingsforhold.

5 Formuleringseksempler

Fuktbare pulvere

	a)	b)
Aktiv bestanddel [A]:B) = 1:3(a), 1:1(b)]	25%	75%
Natriumlignosulfonat	5%	-
Natriumlaurylsulfat	3%	5%
10 Natriumdiisobutylnaftalensulfonat (7-8 mol etylenoksid)	-	10%
Høydispergert kiselsyre	5%	10%
Kaolin	62%	-

- 15 Den aktive bestanddelen blandes grundig med de andre formuleringskomponentene og blandingen males omhyggelig i en egnet mølle, idet det oppnås fuktbare pulvere som kan fortynnes med vann for å gi suspensjoner av den ønskede konsentrasjonen.

20 Pulvere for tørrfrøbehandling

	a)	b)
Aktiv bestanddel [A] : B) = 1:3(a), 1:1(b)]	25%	75%
Lett mineralolje	5%	5%
Høydispergert kiselsyre	5%	-
Kaolin	65%	-
25 Talk	-	20

Den aktive bestanddelen blandes grundig med de andre formuleringskomponentene og blandingen males omhyggelig i en egnet mølle, idet det oppnås pulvere som kan anvendes direkte for frøbehandling.

30 Emulgerbart konsentrat

Aktiv bestanddel (A) : B) = 1:6)	10%
Oktylfenolpolyetylenglykoleter (4 – 5 mol etylenoksid)	3%
Kalsiumdodecylbenzensulfonat	3%
35 Ricinusolje polyglykoleter (35 mol etylenoksid)	4%
Cykloheksanan	30%
Xylenblanding	50%

Emulsjoner av den påkrevde fortynning, som kan anvendes ved plantebeskyttelse, kan oppnås fra dette konsentratet ved fortynningen av vann.

- | | | | |
|----|---|-----|--------------------|
| 5 | <u>Forstøvbare pulvere</u> | a) | b) |
| | Aktiv bestanddel [A] : B) = 1:6(a), 1:10(b)] | 5% | 6% |
| | Talkum | 95% | - |
| | Kaolin | - | 94% |
| 10 | Støvblandinger ferdig for bruk oppnås ved å blande den aktive bestanddelen med bærerne og male blandingen i en egnet mølle. Slike pulvere kan også anvendes for tørr beleggning for korn. | | |
| | <u>Ekstruderte granuler</u> | | <u>% vekt/vekt</u> |
| 15 | Aktiv bestanddel (A) : B) = 2:1) | | 15% |
| | Natriumlignosulfonat | 2% | |
| | Natriumalkylnaftalensulfonat | 1% | |
| | Kaolin | 82% | |
| 20 | Den aktive bestanddelen blandes og males med de andre formuleringskomponentene, og blandingen fuktes med vann. Blandinga ekstruderes og tørkes deretter i en luftstrøm. | | |
| | <u>Suspensjonskonsentrat</u> | | |
| 25 | Aktiv bestanddel (A) : B) = 1:8) | | 40% |
| | Propylenglykol | 10% | |
| | Nonylfenol polyetylenglykoleter (15 mol etylenoksid) | 6% | |
| | Natriumlignosulfonat | 10% | |
| | Karboksymetylcellulose | 1% | |
| 30 | Silikonalje (i form av en 75% emulsjon i vann) | | 1% |
| | Vann | 32% | |
| 35 | Den finmalte aktive bestanddelen blandes omhyggelig med de andre formuleringskomponentene, idet det oppnås et suspensjonskonsentrat som kan fortynnes i vann ved en hvilken som helst ønsket rate. Ved anvendelse av slike fortynninger kan levende planter så vel som planteforingsmateriale behandles | | |

og beskyttes mot angrep av mikroorganismer ved spraying, helling eller neddykking.

Flytbart konsentrat for frøbehandling

5	Aktiv bestanddel (A) : B) = 1:8)	40%
	Propylenglykol	5%
	Kopolymer butanol PO/EO	2%
	Tristyrenfenoletoksylat (med 10 – 20 mol EO)	2%
	1,2-benzisotiazolin-3-on	0,5%
10	Monoazo-pigment kalsiumsalt	5%
	Silikonolje (i form av en 75% emulsjon i vann)	0,2%
	Vann	45,3%

- Den finmalte aktive bestanddelen blandes omhyggelig med de andre
 15 formuleringskomponentene, idet det oppnås et suspensjonskonsentrat som kan fortynnes ytterligere i vann for påføring på frø. Ved anvendelse av slike fortynninger kan formeringsmaterialet behandles og beskyttes mot angrep av mikroorganismer ved spraying, helling eller neddykking.

- 20 Biologiske eksempler

Eksempel B1: Fungicidisk virkning mot *Septoria tritici* (stråleflekk)

- Sporer av soppen fra kryogent lager blandes direkte i næringsoppløsning (PDB potetdekstroseoppløsning). Etter plassering av en (DMSO) oppløsning av
 25 forsøksforbindelsene i en mikrotiterplate (96-brønns format) tilsettes næringsoppløsningen inneholdende sporene. Forsøksplatene inkuberes ved 24°C og vekstinhiberingen evalueres etter 4 dager. Den ventede fungicidiske virkningen beregnes i henhold til Colby-metoden. Resultatene er angitt i Tabeller B1:

- 30 Tabeller B1: Fungicidisk virkning mot *Septoria tritici*:

Tabell B1.1:

Forbindelse A-1.1	Mandipropamid		
ppm	ppm	% aktivitet	
0.2500		70	
0.1250		50	

25

	0.5000	0	
	0.2500	0	
	0.1250	0	Ventet virkning (Colby)
0.2500	0.5000	90	70
0.2500	0.2500	90	70
0.2500	0.1250	90	70
0.1250	0.1250	70	50

Eksempel B2: Fungicidisk virkning mot *Pyrenophora teres* (Nettflekk)

Sporer av soppen fra kryogent lager blandes direkte i næringsoppløsning (PDB potetdekstroseoppløsning). Etter plassering av en (DMSO) oppløsning av

- 5 forsøksforbindelsene i en mikrotiterplate (96-brønns format) tilsettes næringsoppløsningen inneholdende soppsporene. Forsøksplatene inkuberes ved 24°C og inhøieringen av veksten vurderes etter 4 dager. Den ventede fungicidiske virkningen beregnes i henhold til Colby-metoden. Resultatene er gitt i Tabeller B2:

- 10 Tabeller B2: Fungicidisk virkning mot *Pyrenophora teres*:

Tabell B2.1:

Forbindelse A-1.1	Mandipropamid		
ppm	ppm	% aktivitet	
0.2500		50	
0.1250		20	
	1.0000	0	
	0.5000	0	Ventet virkning (Colby)
0.2500	1.0000	70	50
0.1250	0.5000	50	20


Linje 7 til nederst side 24: Eksempel B3: Fungicidisk virkning.. til lutten av tabell

- 15 B4.1

P a t e n t k r a v

1.

- 5 Sammensetning egnet for kontroll av sykdommer forårsaket av fytopatogener, omfattende (A) en forbindelse av formel I



- 10 hvor R₁ er difluormetyl eller trifluormetyl og X er klor, fluor eller brom; og
 (B) Forbindelsen mandipropamid

2.

- 15 Sammensetning ifølge krav 1, hvor komponent (A) er en forbindelse av formel (I), hvor R₁ er difluormetyl.

3.

- Sammensetning ifølge krav 1, hvor komponent (A) er en forbindelse av formel (I),
 20 hvor R₁ er difluormetyl og X er klor.

4.

- Sammensetning ifølge krav 1, hvor komponent (A) er en forbindelse av formel (I),
 hvor R₁ er difluormetyl og X er fluor.

25

5.

- Sammensetning ifølge krav 1, hvor komponent (A) er en forbindelse av formel (I),
 hvor R₁ er difluormetyl og X er brom.

- 30 6. En sammensetning ifølge krav 1, som omfatter som komponent (A) en
 forbindelse valgt fra 3-difluormetyl-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboksylsyre (9-

diklormetyliden-benzonorbornen-5-yl)amid og 3-difluormetyl-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboksylsyre (9-difluormetyliden-benzonorbornen-5-yl)amid, og som komponent (B) mandipropamid.

5 7.

En sammensetning ifølge krav 1, som omfatter som komponent (A) forbindelse 3-difluormetyl-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboksylsyre (9-diklormetyliden-benzonorbornen-5-yl)amid, og som komponent (B) mandipropamid.

10 8.

En sammensetning ifølge krav 1, som omfatter som komponent (A) forbindelse 3-difluormetyl-1-metyl-1H-pyrazol-4-karboksylsyre (9-difluormetyliden-benzonorbornen-5-yl)amid, og som komponent (B) mandipropamid.

15 9.

Sammensetning ifølge krav 1, hvor vektforholdet mellom (A) og (B) er fra 2000:1 til 1:1000.

10.

20 Fremgangsmåte for å kontrollere sykdommer på nytteplanter eller på formeringsmaterialer for dette forårsaket av fytopatogener, som omfatter påføring på nytteplantene, på gristedet for disse eller formeringsmaterialet for disse, av en sammensetning ifølge krav 1.

25 11.

Fremgangsmåte for å kontrollere sykdommer på soyabønneplanter forårsaket av fytopatogener, som omfatter påføring på soyabønneplanten eller dens voksested av en sammensetning ifølge krav 1.

30 12.

Fremgangsmåte ifølge krav 12, hvor fytopatogenet er Phakopsora pachyrhizi.